

# Paracetamol 500mg là kháng sinh gì? Tác động, liều dùng và phương pháp dùng

Paracetamol 500mg là thuốc gì, có khác với những liều sử dụng paracetamol khác không? Liều dùng paracetamol 500mg như nào và tác dụng paracetamol 500mg là gì? Mời bạn cộng tìm hiểu thêm để có thể dùng thuốc kháng sinh đúng giải pháp, giữ gìn sử dụng các biện pháp an toàn cho tính mệnh.

Paracetamol là một cái thuốc không kê đơn nên hầu hết người bệnh có khả năng đơn giản tận được ở những nhà thuốc kháng sinh. Tuy vậy, trước khi dùng kháng sinh paracetamol 500mg, bạn cần nắm rõ những kiến thức mối liên quan, ví dụ: thuốc paracetamol 500mg có công dụng gì thường công dụng paracetamol 500mg ra sao; paracetamol 500mg liều dùng cho người bệnh lớn và trẻ em khác nhau đó là thế nào...

## Paracetamol 500mg là thuốc gì?

Paracetamol 500mg chính là paracetamol (acetaminophen) được bào chế ở hàm số lượng 500mg, có tác động giảm đau đớn từ nhẹ tới vừa. Paracetamol 500mg vừa là một dòng kháng sinh giảm sút đau đớn không kê đơn, có thể mua được ở các nhà kháng sinh và vừa là kháng sinh giảm đau có kê đơn, được bác sĩ chỉ dẫn dùng trong rất nhiều lần trường hợp thí dụ điều trị đau đớn nửa đầu, hạ sốt, trợ giúp điều trị cảm cúm,...

Paracetamol 500mg không đựng hoạt đặc điểm kháng nhiễm trùng, có độ được bảo vệ cao. Nhanh chóng cả bạn gái đang mang bầu, giúp con bú và trẻ tới cũng có thể dùng kháng sinh trong tình huống thật sự cần.

## Chỉ dẫn và ngăn chặn chỉ dẫn sử dụng thuốc kháng sinh paracetamol 500mg

Paracetamol 500mg có tác động gì và được chỉ định dùng trong những trường hợp nào? Liệu có các tình huống nào không thể dùng kháng sinh hay không? Theo đó:

- Chỉ định: có khả năng dùng thuốc paracetamol để suy nhược đau, trị các cơn đau đớn vì nhiều tác nhân khác nhau như đau đớn nửa đầu, đau đớn đầu vì kinh nguyệt, đau bụng kinh, đau đớn vùng thắt lưng, đau đớn răng, đau nhức cơ xương khớp,... thuốc kháng sinh cũng được chỉ định dùng để hỗ trợ suy nhược sốt cũng thí dụ gia tăng các cơn đau nhức bởi cảm cúm, cảm lạnh.
- Ngăn chặn chỉ định: Paracetamol được ngăn chặn chỉ định trong những tình huống quá mẫn cảm sở hữu thuốc; suy gan, thận yếu nặng; thiếu huyết luôn rất nhiều lần lần; thiếu hụt glucose-6-phosphat dehydrogenase (G6PD),... đối tượng nghiện rượu, vừa áp dụng rượu hoặc các đối tượng gặp phải suy dưỡng chất nặng, đang sử dụng kháng sinh có người tương tác mang paracetamol cũng đừng nên sử dụng dòng kháng sinh giảm sút đau đớn này hay chỉ dùng theo giải đáp chỉ dẫn của bác sĩ.

## Thuốc paracetamol 500mg có tác dụng gì?

Paracetamol 500mg được biết tới đó là 1 cái thuốc suy giảm đau đớn hiệu quả, sử dụng được trong trường hợp có kê đơn từ chuyên gia hay không kê đơn. Bạn có thể dùng paracetamol thời điểm muốn suy giảm cảm thấy đau đớn, không dễ chịu tại nhiều cơ quan Trên đây cơ thể, gồm đau đớn đầu, đau đớn nửa đầu, đau răng, đau vì trật khớp, đau vì gãy tay hay những chấn thương khác.... Cùng với xuất, paracetamol 500mg còn được dùng để giúp giảm đau dưới giải phẫu hoặc phẫu thuật.

Những tình huống cảm lạnh, cảm cúm, đau đớn cơ, thấp khớp hay sốt Trên đây 38,5°C cũng có khả năng dùng paracetamol 500mg. Tuy nhiên, nên lưu ý rằng Mặc dù paracetamol 500mg cũng có lợi ích tốt giảm đau đớn như aspirin nhưng kháng sinh không có xác suất trị viêm nhiễm cần thiết không thể thế hoàn toàn giúp aspirin.

## Liều sử dụng paracetamol 500mg

Thuốc kháng sinh paracetamol 500mg liều sử dụng như thế nào là được bảo vệ nhất? Thời gian dùng thuốc kháng sinh, bạn cần tuân thủ đúng liều lượng để tránh các tác dụng phụ có khả năng xảy ra: (1)

### Cho đối tượng lớn và trẻ Trên đây 16 tuổi

Liều dùng paracetamol 500mg giúp bệnh nhân từ 16 độ tuổi trở đến là 1-2 viên/lần. Nếu sử dụng 1 viên paracetamol 500mg, mỗi lần uống giải pháp nhau 4-6 tiếng. Trong khi đấy, ví như dùng cùng lúc 2 viên paracetamol 500mg, cần thiết đợi tối thiểu 6 giờ trước thời điểm tiếp tục sử dụng thuốc.

Cần thiết chú ý, người bệnh lớn chỉ được dùng tối đa 1g (1.000mg) paracetamol mỗi liều (tương đương sở hữu 2 liều paracetamol 500mg/lần uống) và không được dùng quá 4g (tức 8 liều paracetamol 500mg/ngày).

### **Giúp trẻ từ 10 đến 15 tuổi**

Sở hữu trẻ em, liều dùng paracetamol sẽ được đặc tính dựa Vừa rồi số cân nghiêm trọng của trẻ. Cụ thể, liều dùng khuyến cáo giúp trẻ là 10 - 15mg/kg/lần. Thí dụ vậy, ví như trẻ rất lớn 34 kg thì có khả năng sử dụng liều paracetamol 500mg tuy vậy giả dụ trẻ nghiêm trọng sau 32,6kg thì chưa nên cho trẻ sử dụng paracetamol ở liều 500mg.

### **Giúp trẻ cháu dưới 10 tuổi**

Trẻ cháu dưới 10 tuổi có khả năng dùng paracetamol 500mg hay không? Theo lưu ý, trẻ dưới 10 tuổi thường chưa đạt số kg cân không nhỏ theo quy tắc nên chỉ được sử dụng paracetamol liều phải chăng, không được dùng paracetamol hàm lượng 500mg.

## **Phương pháp sử dụng paracetamol 500mg**

Dùng paracetamol 500mg như nào là đúng cách? Đầu tiên, nên thực hiện đúng liều số lượng như hướng dẫn Trên đây (nếu dùng paracetamol 500mg không kê đơn) và làm theo chỉ dẫn của bác sĩ (nếu sử dụng paracetamol 500mg có kê đơn).

Ngoài chảy, trường hợp sử dụng paracetamol loại viên, cần lưu ý hạn chế bẻ đôi thuốc kháng sinh cũng thí dụ dùng thuốc kháng sinh với nước nóng để thuốc đạt tác dụng tốt chuyên nghiệp nhất. Mang paracetamol 500mg loại viên sủi, cần thiết 150-200ml để viên sủi có khả năng hòa tan. Cần đợi viên sủi tan hoàn toàn trong nước thì mới bắt đầu dùng.

## **Chú ý thời gian sử dụng thuốc paracetamol 500mg**

Để thuốc kháng sinh paracetamol 500mg có thể phát huy tác động, khi dùng thuốc kháng sinh cần phải lưu ý:

- Cần thiết vận dụng ý kiến chuyên gia trước lúc sử dụng thuốc trường hợp người mắc phải viêm khớp nhẹ và cần thiết suy giảm đau đớn mỗi ngày. Cùng với ra, các trường hợp có vướng mắc về gan hay thận; mắc phải không đủ cân, suy dinh dưỡng; luôn lấy rượu; bị viêm nặng; bị không đủ hụt glucose-6-phosphatedehydrogenase (thiếu hụt enzyme); bị hen suyễn và nhạy cảm mang aspirin; mắc phải thiếu máu tán máu (sự phân hủy bất thường của các tế bào hồng cầu);... cũng cần phải được sự chỉ định từ chuyên gia trước thời điểm sử dụng thuốc.
- Có thể dùng thuốc kháng sinh mang nước lọc, sữa hoặc nước trái cây. Không dùng thuốc chung mang nước trà, bia, rượu, nước có ga,... đặc biệt với paracetamol 500mg loại viên sủi, đảm bảo nhất cần hòa tan hoàn toàn mang nước lọc (có thể dùng nước ấm).
- Không bẻ đôi kháng sinh mà cần sử dụng nguyên viên hoặc hòa tan hoàn toàn trong nước. Không nhai thuốc kháng sinh.
- Mang người bệnh bị dị ứng tình huống paracetamol, có thể sử dụng ibuprofen để thay thế.
- Không sử dụng kháng sinh paracetamol 500mg luôn (dưới 4 giờ) bởi Điều đó có khả năng thực hành tăng nguy cơ ngộ độc thuốc vì quá liều.
- Lập tức dùng thuốc nhanh chóng thời điểm nhận biết quên liều. Chỉ sử dụng đúng hàm lượng như là liều từng quên, đừng nên dùng thêm, uống gấp đôi để bù lại liều thuốc quên áp dụng.
- Không sử dụng paracetamol 500mg trường hợp không có biểu hiện đau tức hoặc sốt sau 38,5 độ C.
- Đối tượng to đừng nên sử dụng paracetamol 500mg quá 10 ngày luôn và trẻ cháu thì không sử dụng liên tiếp 5 ngày trừ lúc có chỉ dẫn đặc biệt của chuyên gia.
- Ví như có bất cứ biểu hiện bất luôn, cần ngưng dùng thuốc ngay tắp lự.

## **Công dụng phụ của paracetamol 500mg**

Thuốc paracetamol 500mg được dùng đó là 1 mẫu thuốc không kê đơn bởi thuốc kháng sinh có đặc điểm an toàn cao. Mặc dù vậy, một số trường hợp đặc biệt vẫn có thể gặp những phản ứng phụ của thuốc như sưng lưỡi, sưng

họng, sung mặt, ngứa ngáy da, nổi mẩn đỏ Vữa rối da, bong da, hoại tử da, đau đốn bụng... Ngoài ấy, bạn cũng có thể bị hạ thân nhiệt hoặc nâng cao huyết áp đột ngột lúc dùng paracetamol 500mg.

Bởi vậy, các bác sĩ y tế lưu ý, ví như một người bệnh sử dụng paracetamol 500mg và thấy cơ thể có những phản ứng bất luôn thì cần lập tức dùng sử dụng và theo dõi những dấu hiệu Trên. Trong trường hợp các triệu chứng không thuyên suy yếu hoặc có triệu chứng tăng nặng nề thì nên xét nghiệm tại các bệnh viện, giảm thiểu tự trị ở nhà.

## **Quá liều và quên liều**

Dùng paracetamol quá liều có thể gây nên ngộ độc gan và tuân thủ tổn thương gan. Người áp dụng paracetamol 500mg quá liều phổ biến các phản ứng ví dụ vã mồ hôi, đau bụng, không muốn ăn buồn nôn, nôn ói, căng tức khu vực hạ sườn buộc phải,... các triệu chứng này thường diễn ra trong 24 giờ đầu tiên nhanh chóng thời gian dùng thuốc.

Tùy theo hàm lượng paracetamol 500mg quá liều mà các dấu hiệu sẽ có triệu chứng nặng nề hay nhẹ khác nhau. Tình huống ngộ độc paracetamol trầm trọng và dùng nên chữa kịp thời có thể gây thương tổn gan vĩnh viễn, thậm chí tử vong.

Còn sở hữu trường hợp quên sử dụng paracetamol thì bạn cũng không nên quá căng thẳng bởi việc quên liều không dẫn đến ảnh hưởng tới tính mạng. Tuy vậy, tức khắc dưới lúc phát hiện quên liều, cần phải sử dụng liều kế tiếp để hiệu quả giảm sút đau và điều trị được rất hay.

## **Tương tác thuốc kháng sinh**

### **Paracetamol 500mg có thể tương tác với kháng sinh nào?**

Kháng sinh paracetamol được biết tới là 1 loại kháng sinh an toàn, ít gây nên tác dụng phụ. Mặc dù vậy, thuốc kháng sinh có thể dẫn tới tương tác với một số kháng sinh khác như: Tramadol, Amoxicillin, Diclofenac, Metformin, Aspirin, Amitriptyline, Amlodipine, Caffeine, Atorvastatin, Codeine, Clopidogrel, Ibuprofen, Naproxen, Levofloxacin, Furosemide, Diazepam, Gabapentin, Lansoprazole, Levothyroxine, Pantoprazole, Naproxen, Pregabalin, Omeprazole, Prednisolone, Pantoprazole, Ramipril, Ranitidine, Sertraline và Simvastatin.

Bên cạnh đó, một chú ý quan trọng thời gian sử dụng paracetamol 500mg chính là kháng sinh sẽ xảy ra phản ứng tương tác ví như bạn sử dụng cộng thời điểm với một cái thuốc khác cũng có thành phần chứa paracetamol.

### **Paracetamol 500mg tương tác sở hữu rượu và thực phẩm**

Paracetamol 500mg có thể dẫn tới tương tác mang rượu, bia hay những chiếc thức sử dụng có cất cồn. Vì vậy, thuốc không được chỉ dẫn dùng giúp những người bệnh nghiện rượu bia. Bạn cũng cần chú ý không sử dụng paracetamol 500mg tức thì lúc vừa dùng các loại đồ ăn hoặc thực phẩm có cất cồn.

Trường hợp paracetamol 500mg tương tác với cồn trong thực phẩm sẽ gây ra tình trạng mót nôn, nôn ói, mõi mết, đau bụng, chán ăn, sung khớp, da bầm tím, vàng da,...

## **Cách bảo quản kháng sinh paracetamol 500mg**

Việc bảo quản thuốc kháng sinh paracetamol 500mg cũng giống như sở hữu những chiếc thuốc suy yếu đau thông luôn, bạn cần lưu ý để kháng sinh tại chỗ thoáng mát, giảm thiểu đặt kháng sinh ở các vùng có nhiệt độ cao như sắp bếp, gần các thiết bị điện tử,... Cùng với ra, không để paracetamol 500mg va chạm trực tiếp mang ánh sáng mặt trời cũng như là để kháng sinh tại nơi ẩm, mốc, đựng chạm sở hữu nước do có khả năng thực hành đổi thay đặc điểm của kháng sinh hay làm theo giảm tác dụng của thuốc kháng sinh.

Mang paracetamol 500mg, bạn có thể bảo quản thuốc kháng sinh trong điều kiện nhiệt độ từ 15-30°C, giảm thiểu đông lạnh thuốc kháng sinh. Cần thiết dùng dùng thuốc kháng sinh nếu nhận biết thuốc kháng sinh có sự biến đổi về kết cấu, màu sắc, mùi,... hoặc có bất kỳ dấu hiệu bất hay nào.

Đặc biệt, thời điểm bảo quản thuốc kháng sinh, cần để kháng sinh tại các nơi cao, xa khỏi tầm tay của trẻ tòi.

Hiện tại, khoa Nội cô động, hệ thống cơ sở y tế Đa khoa Tâm Anh đang là một trong những địa chỉ chữ tín được nhiều người bệnh chữ tín trong vấn đề xét nghiệm các bệnh lý nội khoa. Khoa quy tụ nhiều chuyên gia, bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm chuyên khoa, được đào tạo bài bản và có rất nhiều lần năm kinh nghiệm. Khoa với nguồn tài

nguyên chung của cơ sở y tế là các trang thiết bị hiện đại, tân tiến bậc nhất trong thăm khám, nhận ra và chữa trị những căn bệnh lý nội khoa ví dụ hệ thống máy CT 768 miếng cắt, máy chụp MRI một,5 - 3 Tesla, máy DSA, đội ngũ chụp X quang treo trần khoa học số, hệ thống máy kiểm tra, vô cùng âm cao cấp...

Paracetamol 500mg là thuốc paracetamol tại hàm lượng cao. Cho nên, cần thiết chu đáo và tuân theo những hướng dẫn sử dụng trước lúc dùng để giảm thiểu những tác động phụ có thể diễn ra. Cùng với xuất, đừng nên sử dụng nhiều kháng sinh để suy yếu đau đớn hay dùng thuốc kháng sinh kéo dài nếu không có chỉ định từ bác sĩ. Lúc gặp các triệu chứng đau đớn cải thiện, đặc biệt là đau đầu cải thiện rất nhiều lần ngày, cơn đau không thuyên giảm thì tin cậy nhất cần thiết tới thăm khám tại những trung tâm y tế và Cơ sở tin cậy để được bác sĩ thăm khám, phát hiện và trả lời cách chữa trị thích hợp.

Bạn có biết:

- <https://eutrip.vn/view/admin/Themes/kcfinder/upload/file/medical/5-thuc-pham-ngua-nep-nhan-tac-dung-tot.htm>
- <http://szintai.hu/ckfinder/userfiles/files/670dc8f390c3b66166659.pdf>
- <https://www.sua.vn/uploads/userfiles/file/670dd82f31e2366170559.pdf>
- <https://benhnhietdoi.vn/Uploads/files/6717629856c5366795816.pdf>
- <http://ebara.com.hk/ckfinder/Zenith/userfiles/files/670f2c0fb341866257567.pdf>
- <http://benhvienydchungyen.vn/ckfinder/userfiles/files/670f1f951ad0e66254373.pdf>
- <https://clubberia.com/js/ckfinder/userfiles/files/670dd86ede20c66170622.pdf>
- <https://www.ipata.org/useruploads/wibichua670ddb73709fd66171395.pdf>
- <http://velkoobchod-man.eu/ckfinder/userfiles/files/670dd855ed3ac66170597.pdf>
- <https://bvtwhue.com.vn/upload/files/670f20732b80966254595.pdf>